豊郷病院医薬品情報

’25-4

2025.12.1(木)

先生　　豊郷病院　　薬剤部

1) 新規採用医薬品をお知らせ致します。
【院外のみ採用医薬品】

	医薬品名	会社名	規格・単位	備　考
1	エンタイビオ皮下注ペン 108 ㎎	武田薬品工業株式会社	108㎎/本	ヒト化抗ヒトα4β7 インテグリンモノクローナル抗体製剤
2	ツムラ七物降下湯エキス顆粒	株式会社ツムラ		漢方製剤
3	ペンタサ錠２５０㎎	杏林製薬株式会社	250 ㎎/T	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

2) 自己注射(インスリン等)の注射針(BDマイクロファインプロ・BDマイクロファインプラス)について

インスリン等の自己注射に使用している注射針(BDマイクロファインプロ・BDマイクロファインプラス)ですが、名称が変更となりますので、以下のようにマスタを変更します。

・BDマイクロファインプロ　⇒　マイクロファインプロ

・BDマイクロファインプラス　⇒　マイクロファイン。

※12 月 2 日の院外処方せんより変更します。

3) 糖尿病治療薬ミチグリニド・Ca錠10㎎(グルファスト錠10㎎)の用法について

当院では、糖尿病治療薬のミチグリニド・Ca錠10㎎(グルファスト錠)の用法を添付文書上の用法用量には食直前と記載されていますが、重要な基本的注意に「効果的に食後の血糖上昇を抑制するため、本剤の投与は毎食直前(5 分以内)とすること」と記載されているため用法を「食前5分以内」としていました。しかし、院外処方では「食直前」で処方されているケースも複数確認しています。これまで当院では「食前5分以内」と「食直前(食前10分以内)」を区別してきました。

今回、電子カルテの用法については「食前5分以内」の用法をなくし、「食直前」に用法を統一します。

4) 不眠症治療薬デエビゴ錠の適正使用について

不眠症治療薬のデエビゴ錠では、「CYP3Aを中等度または強力に阻害する薬剤(イトラコナゾール・クラリスロマイシン・ベラパミル等)との併用する場合は本剤の血漿中濃度が上昇し副作用の発現リスクが高まるおそれがあるため、1 日 1 回 2.5mg とすること」と電子添文及び適正使用ガイドに記載されています。1日1回5㎎以上で併用されている場合に保険で査定を受けることがあります。CYP3Aを中等度または強力に阻害する薬剤が併用されていないかご注意ください。

医師には、この内容について伝えていますので、よろしくお願いいたします。

※その他くわしくは、豊郷病院薬剤部（℡35-5224 直通）までお問い合せください。